

Gelsectan®

Wofür wird Gelsectan® angewendet?

Gelsectan® ist für die Anwendung zur Wiederherstellung der Darmfunktion bei Patienten mit veränderter Funktion aufgrund von Reizdarmsyndrom (RDS), Überempfindlichkeit des Darms oder nach der Einnahme bestimmter Medikamente bestimmt, um Symptome wie chronischen oder wiederkehrenden Durchfall, abdominales Spannungsgefühl, Schmerzen, Blähbauch und Flatulenz zu lindern und zu vermeiden.

In welchen Packungsgrößen ist Gelsectan® erhältlich?

Blisterpackung mit fünfzehn, dreißig oder sechzig Kapseln zur Anwendung bei Erwachsenen.

Wie ist Gelsectan® zusammengesetzt?

Xyloglucan, Erbsenprotein und Traubenkernextrakt, Xylooligosaccharide, Magnesiumstearat (pflanzlich) und amorphe gefällte Kieselsäure.


Wie soll Gelsectan® eingenommen werden?

Abhängig vom Schweregrad der Symptome 1 oder 2 Kapseln zweimal täglich (morgens vor dem Frühstück und abends vor dem Abendessen) im Zeitraum von 2 bis 4 Wochen. Die Behandlung kann falls nötig aufrechterhalten werden.

Anwendungshinweis

Kapsel mit Flüssigkeit schlucken.

Wie funktioniert Gelsectan®?



Das Wirkprinzip von Gelsectan®

Gelsectan® legt einen Gel-Schutz auf die gereizte Darmwand und schützt diese schnell und zuverlässig.

Gelsectan® schützt & unterstützt



SCHÜTZT

die angegriffene Darmwand durch eine innovative Gel-Schicht.^{1,2}



UNTERSTÜTZT

den Aufbau wichtiger Bakterienstämme für eine gesunde Darmflora.³



Linderung von Reizdarmsymptomen wie Durchfall, Blähungen und abdominalem Schmerz.

¹ Piqué N et al.: Xyloglucan, a Plant Polymer with Barrier Protective Properties. Int. J. Mol. Sci. 2018: 19, 673

² Eutamene H et al.: Protective Effect of Mucoprotectants. Gastroenterology 2018, 154

³ Lin S et al.: Prebiotic Effects of Xylooligosaccharides. Gastroent Research Practice 2016

Warnhinweise

- Es ist nicht notwendig vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren. Dennoch ist dies bei schweren oder anhaltenden Symptomen empfehlenswert oder wenn Unsicherheiten bezüglich der Diagnose bestehen, hauptsächlich bei älteren Menschen.
- Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich nicht um eine pharmakologische Behandlung. Falls eine solche Behandlung von einem Arzt empfohlen wird, kann das Medizinprodukt begleitend verabreicht werden.
- Obwohl keine Nebenwirkungen bekannt sind, wird empfohlen, falls nicht anderes vom Arzt verordnet, das Produkt nicht während der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten der Stillzeit anzuwenden.
- Das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums anwenden, das auf der Packung abgedruckt ist.
- Das Produkt nicht anwenden, wenn die Blisterpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Nicht über 25 °C lagern. Nicht einfrieren.
- Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Gegenanzeigen

Gelsectan® soll nicht bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Xyloglucan oder einen der im Abschnitt „Zusammensetzung“ genannten sonstigen Bestandteile des Produkts angewendet werden.

Vertreiber:

Klinge Pharma GmbH
Bergfeldstr. 9
83607 Holzkirchen
Deutschland



DEVINTEC SAGL
Corso Elvezia, 14
6900 Lugano - Switzerland



Devintec Health S.L.
Calle Jimenez, 10
24767 Herreros de
Jamuz Leon - Spain



1370

Medizinprodukt
www.gelsectan.de

50003557 5 D
Rev.03: 09.06.2021